UpToDate モバイルアプリの操作方法(Android 版)

「Google Play」、「Play ストア」、「マーケット」で「UpToDate」と検索し、アプリをダウンロードします

※事前に施設内のネットワークから UpToDate にアクセスし、

Username と Password をご登録ください(ご登録方法は別紙参照) アプリを起動すると、初回は Username と Password を入力してください 以後、30 日間は Usename と Password 入力の必要はありません ※120 日に1度は施設内のネットワークからログインする必要があります!

各種設定変更ができます

※初期設定では検索言語が英語となっております。

日本語での検索をご希望の場合は

以下の手順で言語設定をご変更ください。

一度変更すれば以後は日本語検索できます。

1. 「Search Language」を クリック



2.「Japanese」を クリック



新規検索はこちらから!

※日本語で検索語は入力できますが、

検索結果のトピックタイトルは英語で表示されます



Q Search in Japane 日本語を途中まで入 力すると、入力候補 語が表示されるので その中から選択する

ことも可能です



CME Credits:

Send App Feedback

Wolters Kluwer

©2011-2014 UpToDate, Inc. All rights reserved.

UpToDate モバイルアプリ ホーム画面

ここをクリックすると、専門領域 別に表示切り替えができます




専門領域別に 内容が大きく 変更された トピックの **最新情報**を 確認できます

ブックマークした

ページを確認できます

アプリから閲覧した

履歴を確認できます




トピック構成と各種操作ボタン

トピックの送信:オフラインでも 読みたいトピックが閲覧できます トピックの 新規検索

Outline \times Treatment of hypocalcemia Treatment of hypocalcemia Contributors Disclosures Date SUMMARY AND RECOMMENDATIONS INTRODUCTION INTERPRETATION OF SERUM CALCIUM THERAPEUTIC APPROACH Intravenous calcium Concurrent hypomagnesemia Oral calcium Vitamin D and metabolites Vitamin D - Calcitriol トピックを見る:トピック全文 表示に切り替わります ____H Llymayarathyraidian Find in Topic Show Topic

ブックマークに追加:ホーム画面の「**ブックマーク**」に 反映されます

ホーム画面に 戻ります



Hypocalcemia may be associated with a spectrum of clinical manifestations, ranging from few if any symptoms if the hypocalcemia is mild and/or chronic, to severe life-threatening symptoms if it is severe and/or acute. Thus, the management of hypocalcemia depends upon the severity of symptoms. In patients with acute symptomatic hypocalcemia, intravenous calcium gluconate is the preferred therapy, whereas chronic hypocalcemia is treated with oral calcium and vitamin D supplements.

The treatment of hypocalcemia will be reviewed here. The etiology, clinical manifestations, and diagnostic approach to hypocalcemia are rev 項目を見る:項目表示に plogy of hy 切り替わります Clinical manner sor nypocalcemia" and "Diagno approach to hypocalcemia".)

Show Outline

Find in Topic

Android 端末の画面下のボタン

← ボタン:前の操作画面に戻ります

英語で検索語を入力すると、トピック内のどこに記載されているか、同義語も含めて検索できます

トピック内の検索機能

Treatment of hypocalcemia

Q hyper

Done

mg/dL for every 1 g/dL reduction in the serum albumin concentration. Thus, in patients with hypoalbuminemia or hyporlabuminemia.htm measured serum calcium concentration should be corrected for the abnormality in albumin calculator 1) calculator 1)

検索結果は

ハイライト表示 hether ive o

nether the corrected ive of the ionized ory known to measure

ionized calcium reliably is available, some authorities prefer to measure the ionized calcium directly. Direct measurement of the ionized calcium concentration could be considered in patients with symptoms of

ここをクリックすると次の total ハイライト表示された箇所 but low にジャンプします in......

increased binding of ca "Relation between total calcium concentrations ection on 'Acid-base

1 of 47 Lic hypocal SYNONYM

同義語を検索対象から 外す時はここをクリック

項目表示画面

トピック全文表示画面

※機種やバージョンにより、操作ボタンや 操作方法は若干異なりますので、ご了承ください